

CAMPOFORT® Ultra Ca

Registrované v Českej republike pod číslom: 3310

Kvapalné hnojivo		
Chemické a fyzikálne vlastnosti:		
Znak akosti	Hodnota v % (hm.)	Hodnota v g/l
Celkový vápnik ako CaO	7,5	90
Celkový horčík ako MgO	2,0	24
Bór ako B	0,1	1

Zvláštne pokyny pre používanie: Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín. Používať iba v prípade skutočnej potreby, neprekračovať doporučené dávkovanie.
Obsah balenia: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (t.j. 20 l • 500 l • 1000 l).

Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republica

Distribútor pre SR: Qenerika s.r.o., Nádražná 58, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko

Podmienky skladovania:

Skladujte v originálnych obaloch pri teplote **-25 °C až +30 °C** na chladnom a dobre vetranom mieste.

Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: Bandasky 21 dm³: 3 vrstvy • kontajner 1 m³: 2 vrstvy.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania.

Rozsah a spôsob použitia: Hektárová dávka: **12 kg / ha** (tj. 10 l / ha)

Pri aplikácii dbáme na tieto zásady:

Neprekračujeme doporučenú koncentráciu živného roztoku.

Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepší je ranný (po zídení rosy) alebo neskorý popoludňajší postrek. Postrek pred dažďom alebo počas neho nie je účinný.

Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.

Prípravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Ultra Ca** vhodné do porastov, kde sa objavujú nedostatky vápniku či horčíku. Jeho úloha spočíva v stabilizácii bunkových stien a membrán a rovnako má vplyv na aktivitu kyseliny beta-indolyloctovej.

Doporučené aplikácie

Plodina	Termín aplikácie	Dávka	Možnosť kombinácie	Množstvo vody
obilniny	BBCH 25 – 61	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
kukurica	BBCH 13 – 51	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
repka, horčica, mak, slnečnica	BBCH 16 – 61	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
zemiaky, cukrová repa	BBCH 14 – 85	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
Strukoviny	BBCH 13 – 59	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
chmeľ, ovocné plodiny, zelenina vinná réva	Podľa potreby	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	300 – 2000 l/ha

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných zložiek!

Hnojivo obsahuje malé množstvo dusičnanového dusíku ako N a to 2,6% (hm).

Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 26/2001 Zz. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg). Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Českej republike.

CAMPOFORT® Ultra Ca je bezfarebná až hnedá kvapalina, bez zápachu

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Nebezpečná zložka: Obsahuje dusičnan vápenatý a chlorid vápenatý.

Kategória nebezpečnosti:

Spôsobuje vážne poškodenie očí / podráždenie očí, kategória 2

H319: spôsobuje vážne podráždenie očí.

(P102): Uchovávajte mimo dosah detí.

(P280): Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

(P305+P351+P338): PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak ich ide ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 PRI PRETRVAVAJÚCICH PROBLÉMOCH: Vyhľadajte lekársku pomoc

P301+P310 PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO alebo lekára.



Varovanie!

Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku:

Zvyšky prípravku zhromaždíte k opätovnému použitiu ako hnojivo.

Výrobok je uvádzaný do obehu v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.1.1. Prílohy 1 Nariadenia.